

**SIMETIKON + AKTIVNI UGLJEN  
U JEDNOJ TABLETI**

# **SIM**AKTIV

**ZA MIRAN TRBUH  
I DOBRU PROBAVU**

- **Podrigivanje**
- **Nadimanje**
- **Loša probava**
- **Bolovi i grčevi u trbuhu**
- **Plinovi**

Ovi neugodni simptomi posljedica su prekomjernog nakupljanja plinova u želudcu i crijevima i od njih pati gotovo 30% ljudi.



#### **Najčešći uzročnik je suvremeni način života:**

- Zamjena kvalitetnih obroka „brzom“ hranom
- Preskakivanje obroka ili prejedanje
- Brzo gutanje hrane uz koju se guta i određena količina zraka
- Stres, smanjena tjelesna aktivnost
- Konzumiranje određenih vrsta hrane, gaziranih pića, pušenje

90% pacijenata koji boluju od sindroma iritabilnog kolona praćenog dijarejom, nedostatka enzima gušterače, intolerancije na laktozu, celijakije, crijevne kandidijaze – u sklopu kliničke slike imaju nadimanje, plinove, podrigivanje, bolove ili grčeve u želudcu.


**SIMETIKON I AKTIVNI UGLJEN**  
**POMAŽU U OTKLANJANJU NEUGODNIH SIMPTOMA!**

# SIMAKTIV

SIMETIKON + AKTIVNI UGLJEN (50 mg + 300 mg)

## SIMAKTIV POČINJE DJELOVATI ZA 15 MINUTA!

Dvoslojna tableta oslobađa 50% svojih sastojaka već u želudcu i u roku od 15 minuta dok se ostatak razlaganja odvija u crijevima u roku od jednog sata.



## DVOSLOJNA TABLETA

### SIMETIKON SMANJUJE NADUTOST

razbija mjehuriće plina  
u želudcu i crijevima



### AKTIVNI UGLJEN ANTIFLATULENTNO DJELOVANJE

veže oslobođene plinove i izbacuje  
ih iz organizma putem stolice

## DVOSTRUKIM DJELOVANJEM POTPUNO UKLANJA PLINOVE IZ ŽELUDCA!

- ✓ Smanjuje nadimanje
- ✓ Ublažuje bol i grčeve u želudcu
- ✓ Normalizira probavu
- ✓ Smanjuje podrigivanje

# SIMAKTIV

SIMETIKON + AKTIVNI UGLJEN (50 mg + 300 mg)

**2 x 2 tablete**  
**Nakon bilo kojeg glavnog obroka**



**Za kompletnu informaciju pažljivo pročitajte uputu. SKRAĆENA UPUTA ZA UPORABU**

**Simaktiv, 20 dvoslojnih tableta sa modificiranim oslobađanjem, za oralnu uporabu.** Simaktiv je medicinsko sredstvo u obliku tableta, koje se koristi za olakšavanje neugodnih simptoma povezanih sa gutanjem zraka i intestinalne distenzije. Preporuča se za ublažavanje simptoma povezanih sa nadimanjem trbuha ili crijeva koji nastaju kao posljedica nakupljanja plinova. Simaktiv ublažuje bol i grčeve, sprječava nadutost trbuha zbog plinova (flatulenciju) i podrigivanje.

**Sastav:** Jedna tableta sadrži: Simetikon: 50mg i aktivni ugljen: 300mg.

**Način djelovanja:** učinkovitost ovog medicinskog sredstva se temelji isključivo na mehaničkom djelovanju: simetikon djeluje protiv stvaranja mjehurića plina a aktivni ugljen apsorpira plin. Dvoslojna tableta oslobađa približno 50% sastojaka u želudcu u roku od 15 minuta. Razlaganje tablete se završava u crijevima u roku od jednoga sata. Simetikon i aktivni ugljen se ne resorbiraju u gastrointestinalnom traktu i ne ometaju resorpciju hranjivih tvari.

**Doziranje i način uporabe: odrasli:** 4 tablete dnevno, po mogućnosti 2 tablete nakon bilo kojeg glavnog obroka.

**Poznata neželjena djelovanja:** zbog prisustva aktivnog ugljena stolica može biti tamno smeđa čak i ukoliko se proizvod konzumira u preporučanim dozama. Ovakva obojanost stolice je potpuno normalna i nije znak bolesti. Nisu primijećena ni prijavljena srednjoročna ni dugoročna neželjena djelovanja. Proizvod ne utječe negativno na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja strojevima.

**Upozorenja i mjere opreza:** proizvod nije namijenjen za uporabu kod djece mlađe od 14 godina starosti. Čuvati van dječjeg dohvata. Ne koristite proizvod ukoliko imate želudčanih ili crijevnih lezija. Ne koristite proizvod ukoliko bolujete od opstrukcije crijeva. Ne koristite ovaj proizvod istovremeno sa drugim medicinskim sredstvima ili lijekovima za oralnu uporabu: moć resorpcije aktivnog ugljena i simetikona mogu imati negativan utjecaj na učinkovitost. Ukoliko koristite neke lijekove, prije uzimanja Simaktiva, posavjetujte se sa svojim liječnikom. Simetikon može ometati djelovanje nekih reagensa koji se koriste u dijagnostici, npr. Gvajak smole. Ovaj proizvod namijenjen je za kontinuiranu uporabu u trajanju od najviše 30 dana; Ukoliko se simptomi nastave, konzultirajte se sa svojim liječnikom.

**Proizvođač:** NTC S.r.l.; Via Luigi Razza, 3 – 20124 Milano (MI) Italija.

**Ovlašteni predstavnik:** EBORpharma j.d.o.o., Heinzelova 62, 10000 Zagreb.

**Broj i datum rješenja upisa u Registar medicinskih sredstava:** 515-02-02464-19-004 od 19.11.2019. godine.

Samo za stručnu javnost